# Quinkana

***Quinkana*** es un género extinto de cocodrilo mekosuquino que vivió en Australia desde hace unos 24 millones de años hasta hace unos 40.000 años. En el Pleistoceno *Quinkana* fue uno de los grandes depredadores terrestres de Australia, dotado de extremidades alargadas y dientes zifodontes (comprimidos lateralmente, recurvados y aserrados).[note 1] El nombre *Quinkana* viene de los "Quinkans", un pueblo legendario de los mitos de los aborígenes australianos.

## Índice


**Especies**

**Apariencia**

**Especies cercanamente emparentadas**

**Notas**

**Referencias**

**Enlaces externos**


***Quinkana***

Rango temporal: Oligoceno-Pleistoceno

Pre Є Є O S D C P T J K PgN

*Quinkana fortirostrum*

**Taxonomía**

| | |
|---|---|
| Reino: | Animalia |
| Filo: | Chordata |
| Clase: | Sauropsida |
| Orden: | Crocodilia |
| Familia: | Crocodylidae |
| Subfamilia: | Mekosuchinae† |
| Género: | ***Quinkana*** Molnar, 1981 |

**Especies**

- *Q. fortirostrum* Molnar, 1981 (especie tipo)
- *Q. babarra* Willis & Mackness, 1996
- *Q. timara* Megirian, 1994
- *Q. meboldi* Willis, 1997

## Especies

Las especies incluidas en *Quinkana* incluyen: la especie tipo *Q. fortirostrum* de Queensland del Plioceno y el Pleistoceno, *Q. babarra* de Queensland de principios del Plioceno, *Q. timara* del Territorio del Norte de mediados del Mioceno y *Q. meboldi* de Queensland de finales del Oligoceno.

## Apariencia

Las especies más antiguas (*Q. meboldi* y *Q. timara*) eran de pequeño tamaño, con cerca de 2 metros de largo, comparadas a las especies del Plio-Pleistoceno de mayor tamaño en las que evolucionaron. Se ha estimado que *Quinkana fortirostrum* pudo sobrepasar los 5 metros de longitud, convirtiéndolo en uno de los mayores depredadores de la Australia de esa época, sólo sobrepasado en tamaño por el varano gigante, *Megalania* (*Varanus priscus*).

## Especies cercanamente emparentadas

*Quinkana* es un género dentro de la subfamilia Mekosuchinae. Otros géneros incluidos en este grupo son: *Australosuchus*, *Baru*, *Kambara*, *Mekosuchus*, *Pallimnarchus* y *Trilophosuchus*.

## Notas

1. Los dientes zifodontes tienden a aparecer en los crocodilianos terrestres debido a que, a diferencia de sus parientes acuáticos, son incapaces de capturar a sus presas simplemente sosteniéndolas debajo del agua hasta ahogarlas; de modo que necesitan dientes cortantes con los cuales destazar a sus presas.

## Referencias


- Willis, P.M.A.; Mackness, B. (1996). «*Quinkana babarra*, a new species of ziphodont mekosuchine crocodile from the early Pliocene Bluff Downs Local Fauna, Northern Australia, with a revision of the genus». *Proceedings and Journal of the Linnean Society of New South Wales* **116**: 143-151.


## Enlaces externos

- (en inglés) Australia's Lost Kingdoms (https://web.archive.org/web/20050801234100/http://www.lostkingdoms.com/facts/factsheet55.htm)
- Portal:Saurópsidos. Contenido relacionado con **Saurópsidos**.

---


Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinkana&oldid=121405306»

**Esta página se editó por última vez el 18 nov 2019 a las 16:30.**

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.